



WE LEAD.
WE LEARN.



Suomen suden- korennot



Yleistietoa sudenkorennoista

Sudenkorennot ovat rantojen kaunottaria, korumaisia lentotaitureita, joiden historia ulottuu dinosauruksia kauemmaksi, 325 miljoonan vuoden taakse.

Sudenkorentoja tavataan erityisesti vesien äärellä, kuten pienillä puroilla, joilla, lammilla, järvillä ja soilla. Sudenkorentojen kehitys on vaillinainen, kotelovaihetta ei ole. Munat munitaan veteen, jossa niistä kehittyy toukkia. Toukkavaihe on pitkä, tyyppillisesti muutamia vuosia. Toukasta kuoriutuu aikuinen, joka elää muutaman viikon tai runsaan kuukauden. Suurimman osan elämästään sudenkorento siis elää vedessä sukkeltelevana kömpelönä toukkana. Korea aikuisvaihe on vain lyhyt huipennus sudenkorennon elämässä. Ei ihme, että sudenkorentojen elämä on kiehtonut runoilijoita ja muita taiteilijoita.

Suomessa on tavattu 53 sudenkorentolajia. Koko maailmasta tunnetaan runsaat 5 500 lajia. Meidänkin lajistoomme kuuluu ulkonäöltään ja käyttäytymiseltään hyvin erilaisia lajeja. Värikirjokin on laaja: kaikki pää- ja välivärit ovat edustettuina. Useimmilla lajeilla koiraat ja naaraat ovat keskenään erivärisiä, ja monilla lajeilla nuoren yksilön, erityisesti koiraiden, väri muuttuu ikääntyessä, aivan toiseksi.

Sudenkorento on peto niin toukkana kuin aikuisena. Aikuisravinto koostuu pienemmistä hyönteisistä, kuten hyttysistä, kärpäsisistä ja paarmoista, joita sudenkorennot tulevat joskus napsimaan ihmisten ympäriltä. Nuoren aikuisen elämä kuluu saalistellessa. Tällöin ne lentelevät kaukanakin vesistöistä. Sukukypsyyden saavutettuaan ne palaavat vesistöjen äärelle. Useimpien lajien koiraat pitävät reviiiriä, joka voi olla esimerkiksi pätkä rantaviivaa.

Sudenkorentojen elämässä on paljon kiehtovaa seurattavaa. Reviirikäyttäytymistä ja saalistamista on helppo päästää näkemään, samoin paritteluja ja munintaa. Sähkyväsiipisten neidonkorentojen kosintamenojen näkeminen on erityisen hieno kokemus.

Sudenkorennoistamme neljää pidetään uhanalaisena. Niitä uhkaavat vesistöjen rakentaminen, likaantuminen ja rehevöityminen. Useat muutkin ovat vähentyneet, kun soita on ojitettu ja virtavedet ovat likaantuneet. Sudenkorennot ovat ympäristön laadun mittareita. Jos tietty sudenkorentolaji häviää vakinaiselta esiintymispaikaltaan, se kertoo elinympäristön kielteisestä muutoksesta, esimerkiksi veden likaantumisesta. Sudenkorentoja suojellaan suojelemalla niiden elinympäristöjä.

Seuraavassa esitellään kaikki Suomen 53 sudenkorentolajia. Valokuvat esittävät vapaita sudenkorentoja niiden aidoissa elinympäristöissä. Ainoana poikkeuksena on tundrakiiltokorento, joka on valokuvattu pyydystettynä. Kaikki sudenkorennot on valokuvattu Suomessa.

Näin pienessä esitteessä ei ole mahdollista esittää tarkkoja määrittäsohjeita. Helppimpien lajien määrittäminen onnistuu tämänkin oppaan avulla, mutta monissa tapauksissa lajit muistuttavat toisiaan niin paljon, että tarvitaan tarkemmat määrittäsohjeet. Sellaiset löytyvät vuonna 2002 ilmestyneestä ”Suomen sudenkorennot” -kirjasta (Tammi). Jos kiinnostus sudenkorentoihin heräsi, niin kyseisessä kirjassa on runsaasti lisää tietoa ja valokuvia sudenkorennoista sekä mm. levinneisyyskartat.

Tässä esitteessä kerrotaan kunkin lajin suomalainen, ruotsalainen ja tieteellinen nimi. Ruotsinkielisten nimien lähde on ollut Göran Sahlénin kirja ”Sveriges Trollsländor”.

*

Tämän opasvihkosen on laatinut Sami Karjalainen, joka on myös ottanut ”korentojulisteon” ja samalla tämän oppaan valokuvat.

Toivotamme kaikille ”korento-oppaamme” käyttäjille elämysrikkaita luontoretkiä

Toukokuussa 2004

UPM Metsä


Immenkorento

Blåbandad jungfruslända, *Calopteryx splendens*
Harvinaisempi kahdesta neidonkorentolajistamme. Esiintyy Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa, mutta ei Ahvenanmaalla. Koiraan siivissä on tummansininen vyö, ja naaraan siivet ovat vihreät. Lepättelee perhosmaisesti virtaavien vesien äärellä. Tavataan erityisesti keskikokoisilla joilla ja harvemmin puroilla.



Neidonkorento

Blå jungfruslända, *Calopteryx virgo*
Yleisempi kahdesta neidonkorentolajistamme. Tavataan lähes koko maassa. On joinakin vuosina hyvin runsaslukainen. Koiraan siivet ovat lähes kokonaan tummansiniset, ja naaraan siivet ovat ruskeat. Suosii erityisesti pieniä jokia ja puroja, mutta tavataan usein myös harhailemassa kaukana virtavesistä. Lento on perhosmaista hidasta lepattelua.



Isokeijukorento

Kraftig smaragdflickslända, *Lestes dryas*
Isompi ja harvinaisempi kahdesta paljon toisiaan muistuttavasta keijukorennotta. Tätä jokseenkin harvinaista lajia tavataan erilaisissa pienvesissä, kuten saviallikoissa ja sorakuoppien lampareissa. Keijukorennot pitävät lepoasennossa siipiään yleensä osittain levällään.



Sirokeijukorento

Allmän smaragdflickslända, *Lestes sponsa*
Pienempi ja yleisempi kahdesta keijukorennotamme. Lajia tavataan loppukesällä runsaslukuisena hyvin erilaisten vesien äärellä. Naaras on selvästi sirompi kuin isokeijukorennotnaaras, mutta sekä koiraan että naaraan määrittäminen voidaan tehdä varmasti vain ruumiin yksityiskohtien perusteella.



Vihertytönkorento

Tång-flickslända, *Coenagrion armatum*
Yksi kahdestatoista tytönkorennotamme. Lajin erityistuntomerkki on koiraan hyvin suuret perälisäkkeet. Esiintyy maassamme jokseenkin harvinaisena, mutta tavataan joskus hyvin runsaslukuisena. Lentoaika on alkukesällä, pääasiassa kesäkuussa, jolloin sitä tavataan varsin erilaisten vesien äärellä.




Keihästytönkorento

T-tecknad flickslända, *Coenagrion hastulatum*
Varmaankin yleisin ja runsaslukuisin sudenkorentomme. Esiintyy lähes kaikenlaisten vesien äärellä lähes koko maassa. On saanut nimensä koiraan takaruumiin toisessa jaokkeessa olevan keihäänkärjen muotoisen (tai T-kirjainta muistuttavan) kuvion mukaan. Useimpien muiden tytönkorennotien tapaan lentelee erityisesti alkukesällä.



Taigatyönkorento

Johanssons flickslända,
Coenagrion johanssoni
Yksi pienimmistä lajeis-
tamme. Esiintyy koko
maassa, mutta on ylei-
sempi Keski- ja Pohjois-
Suomessa kuin etelässä.
Tavataan erityisesti neva-
reunaisilla suolammilla,
mutta myös muunlaisissa
suoympäristöissä.




Kuutyönkorento

Mån-flickslända,
Coenagrion lunulatum
Laji on saanut nimensä
koiraan takaruumiin toi-
sen jaokkeen kuin sirpin
muotoisen kuvion mu-
kaan. Harvinainen Etelä-
ja Keski-Suomessa, mut-
ta Lapissa paikoin yleinen
ja runsas. Esiintyy erityi-
sesti lammilla. Paras len-
toaika osuu alkukesään.



Eteläntyönkorento

Ljus u-flickslända,
Coenagrion puella
Löydettiin Suomesta ensi
kerran vuonna 1958. En-
nen kesää 2002 lajia oli
tavattu vain Kaakkois-
Suomessa, mutta vuosilta
2002 ja 2003 on useita
havaintoja muualtakin
etelärannikon tuntumas-
ta. Hyvin yleinen Keski-
Euroopassa ja mahdolli-
sesti yleistymässä Suo-
messakin. Muistuttaa ul-
konäöltään erityisesti sirotyönkorentoa. Uhanalaisluokitus:
vaarantunut.



Sirotyönkorento

Mörk u-flickslända,
Coenagrion pulchellum
Edellistä suuresti muis-
tuttava, mutta tummempi
ja paljon yleisempi. Ylei-
nen erityisesti Etelä-Suo-
messa meren äärellä,
mutta harvinaistuu Kes-
ki-Suomeen päin mentä-
essä. Koiraan takaruu-
miin toisessa jaokkeessa
on Y-kirjaimen tai ääni-
raudan muotoinen kuvio.



Isotyönkorento

Rödögonflickslända,
Erythromma najas
Työnkorenoistamme
suurikokoisin ja helposti
tunnistettavissa punais-
ta silmistään. Tosin naa-
raan silmät ovat vain hei-
kosti punertavat. Yleinen
Etelä- ja Keski-Suomes-
sa. Laskeutuu tyypillisesti
kelluslehdille.



Kääpiötyönkorento

Dvärgflickslända,
Nehalennia speciosa
Selvästi pienin suden-
korentolajimme. Ruumiin
koko pituus on vain noin
kaksi senttiä. Elelee huo-
maamatonta elämää
maanpinnan tuntumassa.
Tavattu vain lounaisim-
massa Suomessa rannikon
läheisyydessä. Tällä het-
kellä tunnetaan vain yksi
esiintymä, joka löydettiin
Tammisaaresta vuonna 2002. Tätä edeltävä havainto oli vuodel-
ta 1981. Uhanalaisluokitus: erittäin uhanalainen.



Punatyöntökorento

Röd flickslända,
Pyrrhosoma nymphula
Ainoa pääväriltään punainen työntökorentomme, joten helposti tunnistettavissa. Elelee virtaavissa vesissä, puroilla ja joilla, ja niiden hieman varjoisimmissakin kohdissa. Jokseenkin harvinainen ja yleensä melko vähälukuinen. Ei tavattu Ahvenanmaalla.



Okatyöntökorento

Sjöflickslända,
Enallagma cyathigerum
Useita muita työntökorentojamme suuresti muistuttava laji. Naaraan erityistuntomerkki on takaruumiin alapuolella lähellä kärkeä oleva pieni oka, josta laji on saanut suomenkielisen nimensä. Yleinen lähes koko Suomessa. Elää varsin erilaisten vesien äärellä ja esiintyy myös suurten järvien vähäkasvustoisilla rannoilla, joilla ei tavata juuri muita työntökorentoja. Yksi runsaslukuisimpia korentolajeja koko maailmassa.




Hoikkatyöntökorento

Allmän kustflickslända,
Ischnura elegans
Muistuttaa erityisesti kerityöntökorentoa, mutta on sitä selvästi yleisempi ja myös hieman suurempi. Nämä lajit erottaa muista työntökorennoista siipien kärkien mustavalkoisista siipitäplistä (muilla ne ovat yksiväriset). Esiintyy erityisesti etelärannikollamme ja harvinaistuu sisämaahan mentäessä. Merenlahdilla usein hyvin runsas. Naaraasta on useita eri värimuotoja.



Kerityöntökorento

Mindre kustflickslända,
Ischnura pumilio
Hyvin harvinainen laji, joka muistuttaa ulkonäöltään hoikkatyöntökorentoa. Siitä poiketen elää erilaisissa pienvesissä, kuten sorakuoppien lampareissa ja vastaruopatuissa ojissa ja vaihtaa elinpaikkaa muutaman vuoden välein. Tavattiin maastamme ensi kerran vuonna 1984 Espoosta. Ensimmäinen populaatio löydettiin virolahtelaiselta sorakuopalta, jossa se eleli ainakin vuosina 2000–2002. Laji on tunnettu vaellustaipumuksestaan.



Sulkakoipikorento

Flodflickslända,
Platycnemis pennipes
Muistuttaa työntökorentoja, mutta voidaan tunnistaa esimerkiksi sulkamaisiksi leventyneistä raa-joistaan, joiden keskellä kulkee musta juova. Esiintyy virtaavissa vesissä ja on jokseenkin yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta ei tavata Ahvenanmaalla. Sopivalla paikalla hyvin runsaslukuinen.



Karvaukonkorento

Tidig mosaikslända,
Brachytron pratense
Ainoa alkukesällä lentävä ukonkorentomme. Jokseenkin harvinainen laji, joka lienee yleisimmillään maan lounaisosissa, mutta jota ei ole tavattu Ahvenanmaalla. Levinneisyys ulottuu mantereella Keski-Suomen eteläosiin saakka. Esiintyy merenlahdilla ja pienillä järvillä ja lammilla. Ruumis on nimensä mukaisesti karvainen. Koko on useimpia muita ukonkorentoja pienempi.



Pohjanukonkorento

Fjällmosaikslända,
Aeshna caerulea

Pohjois-Suomen yleisin sudenkorento, joka on Etelä-Suomessa hyvin harvinainen ja soiden ojituksen myötä vähentynyt. Koiras on helposti tunnistettavissa heleän vaaleansinisestä takaruumiista. Ei ole yhtä kestävä lentäjä kuin muut ukonkorennot, vaan laskeutuu usein lepäämään.



Isoukonkorento

Sibirisk mosaikslända,
Aeshna crenata

Siipiväliltään suurin lajimme ja jyrkempi kuin lähimmät sukulaisensa. Esiintyy harvinaisena maamme etelä- ja itäosissa nevareunaisilla ja syvärintaisilla metsäjärvilä ja -lammilla. Naaraalla on siivissään isot tummanruskeat läiskät.



Kirjoukonkorento

Blågrön mosaikslända,
Aeshna cyanea

Koiras on värikkäimpiä sudenkorentojamme sinisine ja vihreine kirjailuineen. Yleensä jokseenkin harvinainen, mutta joinkin vuosina melko yleinen. Elinympäristöjä ovat varjoiset lammet, ojat ja kaivanteet. Koiraat ovat uteliaita ja voivat veden äärellä tulla lentämään lähelle ihmisiä.



Ruskoukonkorento

Brun mosaikslända,
Aeshna grandis


Loppukesän tavallisimpia lajeja. Helposti tunnistettavissa ruosteeneruskeasta värityksestään. Tulee usein saalistelemaan pihaille ja jopa kaupunkien keskustoihin. Hyvin yleinen lähes koko maassa. Lämpimällä säällä voi lentää vielä myöhään illalla.



Siniukonkorento

Starrmosaikslända,
Aeshna juncea

Vaikeasti erotettavissa suoukonkorennot ja voidaan sekoittaa myös isoukonkorentoon ja rannikkoukonkorentoon, mutta on niitä kaikkia yleisempi ja tavataan koko maassa. Lähes kaikenlaisten vesien laji. Päälentoaika on elokuussa niin kuin useimmilla muillakin ukonkorennoilla.



Etelänukonkorento

Höstmosaikslända,
Aeshna mixta

Uusin tulokas maamme lajistoon. Tavattiin ensi kerran vuonna 2002 Porvoon Pellingissä. Tämän jälkeen vuosina 2002 ja 2003 lajista saatiin havaintoja useasta muustakin etelärannikon kunnasta ja myös Ahvenanmaalta. Suomessa tavatut yksilöt ovat vaeltaneet tänne etelästä.



Rannikkoukonkorento

Vassmosaikslända, *Aeshna osiliensis*
Erityisesti isoukonkorentoa ulkonäöltään muistuttava laji, mutta elää siitä poiketen erityisesti runsaskasvustoisilla merenlahdilla ja rannikon välitörmässä läheisyydessä sijaitsevilla lammilla. Jokseenkin harvinainen, mutta tavataan laajalti rannikollamme.



Suoukonkorento

Gungflymosaikslända, *Aeshna subarctica elisabethae*
Erityisesti siniuonkorentoa muistuttava laji, mutta koiras on väritykseltään tummemman sininen. Elää erityisesti suolammilla sekä muissa suoympäristöissä. Jokseenkin harvinainen, mutta on tavattu lähes koko maassa.



Viherukonkorento

Grön mosaikslända, *Aeshna viridis*
Elää vain erittäin runsaskasvustoisilla järvillä, joilla kasvaa sahalehteä (*Stratiotes aloides*). Tunnetaan Suomesta vain noin kymmeneltä järveltä. Lajin erityispiirre on auringonlaskun aikaan tapahtuva hämäräparveilu, jolloin yksilöt saalis-tavat yhdessä. Parhaiten lajin tunnistaa sivulta lähes kokonaan vihreästä keskiruumiista. Rauhoitettu. Uhanalaisluokitus: erittäin uhanalainen.



Aitojokikorento

Sandflodtrollslända, *Gomphus vulgatissimus*
Yksi kolmesta jokikorennostamme ja niistä aikaisimmin kesällä esiintyvä. Suosii hitaammin virtaavia vesiä kuin muut jokikorennostamme. Jokseenkin harvinainen laji, joka lie-nee taantunut ainakin rannikkoalueella. Puutuu Ahvenanmaalta muiden jokikorentojen ta-paan. Nuoret yksilöt lentelevät usein kilometrien päässä vesistöistä.



Piitijokikorento

Stenflodtrollslända, *Onychogomphus forcipatus*
Jokseenkin harvinainen, erityisesti maamme järvi-alueella esiintyvä laji, joka suosii erityisesti pieniä ja keskisuuria nopeasti virtaavia jokia. Koiraan tunnistaa helposti isoista ja piitimäisistä perälisä-keistä.




Kirjojokikorento

Grön flodtrollslända, *Ophiogomphus cecilia*
Harvinaisin kolmesta jokikorennostamme. Pää ja keskiruumis ovat vihreät. Levinneisyys on itäinen, eikä lajia ole tavattu Länsi-Suomesta. Suosii tasaisesti ja nopeasti virtaavia pieniä ja keskisuuria jokia.



Purokorento

Kungstrollslända,
Cordulegaster boltonii
Helposti tunnistettavissa pitkästä ja hoihasta ruumiista sekä keltamustasta värityksestä. Naaraalla on pitkä munanasetin takaruumiin päässä. Tämä jokseenkin harvinainen laji on yleisimmillään järvialueella ja sitä ei ole tavattu länsirannikolla, eikä Ahvenanmaalla. Suosii pieniä ja kirkasvetisiä puroja, joissa on sora- tai hiekka-pohja. Koiraat puolustavat reviireitään lentämällä edestakaisin puron tai joen päällä.



Vaskikorento **Guldtrollslända,**

Cordulia aenea
Yksi kesän ensimmäisiä sudenkorentolajeja ja yleinen laji, joka esiintyy lähes koko maassa. Muistuttaa kiiltokorentoja (kuuluu itsekin kiiltokorentojen heimoon) ja on tunnistettavissa parhaiten perälisäkkeistä. Esiintyy erityisesti lammilla ja järvillä.



Liitokorento

Tväfläckad trollslända,
Epiptera bimaculata
Harvinainen ja paikoitainen laji, joka lienee yleisimmillään läntisellä Uudellamaalla. Lajia on vaikea löytää, koska se lentelee veden yllä kaukana rannasta tai korkealla maan päällä. Muistuttaa ruskohukankorentoa, vaikka ei olekaan sen lähisukulainen. Esiintyy erityisesti runsaskasvustoisilla järvillä ja lammilla, joissa on laajat ruoikkorannat.



Aapakiiltokorento

Fjälltrollslända,
Somatochlora alpestris
Levinneisyydeltään pohjoinen laji, jota ei tavata eteläisimmässä Suomessa, mutta on Lapissa paikoin jokseenkin yleinen. Muistuttaa muita kiiltokorentoja ja erityisesti tundrakiiltokorentoa. Esiintyy erityisesti pienillä avosoilla sekä soiden korpimaisilla reunoilla. Elää myös Keski-Euroopan vuoristoalueilla.




Hoikkakiiltokorento

Nordlig glanstrollslända,
Somatochlora arctica
Koko maassa tavattava laji, joka on harvinainen etelässä. Esiintyy erityisesti avosoilla ja on pohjoisessa paikoin yleinen, mutta on taantunut soiden ojituksen myötä Etelä-Suomessa. Elää Keski-Euroopan vuoristoalueilla. Koiraan tunnistaa pihittimäisistä tasaisesti kaartuvista perälisäkkeistä.



Täpläkiiltokorento

Gulfläckig glanstrollslända,
Somatochlora flavomaculata
Jokseenkin harvinainen Etelä- ja Keski-Suomessa esiintyvä laji, jonka tunnistaa takaruumiin sivujen keltaisista täplistä. Koiraan täplät ovat huomattavasti pienemmät kuin naaraalla. Esiintyy erityisesti soistuneilla rantaniityillä.



Välkekorento

Metalltrollslända,
Somatochlora metallica
Kiiltokorennoistamme
heleimmän vihreä. Ylei-
nen ja lähes koko maassa
esiintyvä laji, joka suosii
erityisesti pikkujokia,
ojia ja puroja, mutta
esiintyy myös järvillä ja
lammilla. Naaraan tun-
nistaa helposti (kuvassa
näkyvästä) isokokoisesta
sukuaukon suojuksesta.



Tundrakiilto- korento

Tundratrollslända,
Somatochlora sahlbergi
Maailman pohjoisin su-
denkorentolaji ja hyvin
harvinainen. Tavataan
Suomessa vain pohjoi-
simmassa Lapissa tuntu-
riseutujen koivu- ja pal-
jakkavyöhykkeen raja-
mailla. Elää lammilla ja
suoallikoilla. Koiraan
tunnistaa perälisäkkeistä,
jotka taipuvat jyrkässä kulmassa toisiaan vastaan.



Litteähukan- korento

Bred trollslända,
Libellula depressa
Helposti tunnistettava litteästä ja leveästä takaruumiistaan. Levisi Suomeen kaakosta 1910-luvulla. Nykyisin suhteellisen harvinainen, mutta yleisyys vaihtelee vuosittain. Esiintyy joinakin vuosina etelärannikon tuntumassa suhteellisen yleisenä. Elää ihmisen kaivamissa ojissa, sorakuopissa ja lammikoissa. Parittelu tapahtuu lennossa ja kestää vain muutaman sekunnin.



Sorjahukankorento

Spetsfläckad trollslända,
Libellula fulva
Hyvin harvinainen laji.
Ennen vuotta 2002 Suo-
mesta tunnettiin vain yksi
vakiintunut esiintymä,
Kiteenjoella. Vuosina
2002 ja 2003 laji löydettiin useasta muustakin paikasta, mm. Lopelta, Pohjasta ja Kerimäeltä. Esiintyy virtaavissa vesissä. Nuoreen koiraan vaalean oranssi takaruumis muuttuu iän myötä sinihärmäiseksi. Uhanalaisluokitus: erittäin uhanalainen.



Ruskohukan- korento

Fyrfläckad trollslända,
Libellula quadrimaculata
Yleisimpiä ja tavanomaisimmin nähtyjä sudenkorentolajejamme. Aloittaa lentonsa ensimmäisten sudenkorentojen joukossa toukokuun lopussa ja on hyvin yleinen suuressa osassa maata. Parittelu tapahtuu lennossa ja kestää muutamia sekunteja. Tunnettu vaeltajalaji.



Merisinikorento

Stor sjötrollslända,
Orthetrum cancellatum
Toinen kahdesta sinikorennostamme ja niistä yleisempi ja isompi. Esiintyy jokseenkin yleisenä rannikon läheisyydessä. Sisämaasta on vain vähän havaintoja. Nuoret yksilöt ovat pääväriltään keltaisia, mutta koiras muuttuu iän myötä sinihärmäiseksi, ja naaraan väri himmenee.



Hoikkasinikorento

Liten sjötrollslända,
Orthetrum coerulescens
Ulkonäöltään paljon me-
risinikorentoa muistutta-
va laji, mutta pienempi ja
sirompi. Laji on harvinaisen
ja esiintyy pienillä
metsäpuroilla ja joilla, ja
erityisesti niiden järvi-
ruokoa kasvavilla kohdil-
la. Luokiteltu lähes
uhanalaiseksi eli silmälä-
pidettäväksi.




Tummasyyskorento

Svart ängstrollslända,
Sympetrum danae
Yksi viidestä syyskoren-
nosta. Pienikokoinen ja
hyvin yleinen. Sukukyp-
sät koiraat ovat lähes ko-
konaan mustia, mutta
nuorilla koirailta ja naa-
railla on runsaasti keltais-
ia kirjailuja. Ei ole vaa-
telias elinympäristönsä
suhteen, vaan lentelee lä-
hes kaikenlaisten vesistö-
jen äärellä.



Elokorento

Gulfläckad
ängstrollslända,
Sympetrum flaveolum
Yleinen laji, jonka tun-
nistaa siipien tyvien
isoista kullankeltaisista
läiskistä. Tosin joiltakin
naarailta nämä läiskät
puuttuvat lähes koko-
naan. Aloittaa lentonsa
aiemmin kesällä kuin
muut syyskorennot. Pää-
lentokausi on heinäkuun
jälkipuoliskolla ja elokuussa. Esiintyy järvillä, lammilla ja me-
renlahdilla sekä kosteikoilla.



Verikorento

Blodröd ängstrollslända,
Sympetrum sanguineum
Harvainen laji, joka lie-
nee maassamme vakitui-
nen vain Ahvenanmaalla.
Sielläkin laji on harvinaisen.
Kooltaan varsin pie-
ni. Koiraan punainen väri
on hyvin voimakas, ve-
renpunainen. Elinympä-
ristöjä ovat lammet ja jär-
vet. Luokiteltu lähes
uhanalaiseksi eli silmälä-
pidettäväksi.



Lännensyyskorento

Stor ängstrollslända,
Sympetrum striolatum
Vain Ahvenanmaalla ja
Lounais-Suomen saaris-
tossa tavattava laji. Ahve-
nanmaalla varsin yleinen.
Muistuttaa hyvin
paljon punasyyskoren-
toa, jota tavataan koko
Etelä-Suomessa. Esiin-
tyy merenlahdilla sekä
lammilla.



Punasyyskorento

Allmän ängstrollslända,
Sympetrum vulgatum
Lännensyyskorentoa
erittäin paljon muistutta-
va, mutta selvästi yleis-
empi. Erityisen yleinen
laji on rannikkoseudulla,
mutta esiintyy Etelä-
Suomessa sisämaassa-
kin. Esiintyy merenlah-
tien lisäksi järvillä ja
lammilla. Kuuluu myö-
häisimmin syksyllä ta-
vattaviin lajeihin yhdessä muutaman ukonkorento- ja syysko-
rentolajin kanssa. Voi säiden suosissa lennellä vielä lokakuun
alkupuolella.



Sirolampikorento

Pudrad kärtrrollslända, *Leucorrhinia albifrons*
Yksi viidestä lampikorennosta, joiden yhteinen tuntomerkki on valkoinen naama. Muistuttaa erityisesti lummelampikorentoa, mutta takaruumis on hoikempi, eikä peräpäästään litistynyt. Jokseenkin harvinainen ja yleisimmillään maamme järvialueen eteläosissa. Parasta elinympäristöä ovat suurenaiset lammet. Rauhoitettu.



Lummelampikorento

Bred kärtrrollslända, *Leucorrhinia caudalis*
Sirolampikorentoa muistuttava laji, mutta takaruumis on leveä ja peräpäästä litistynyt. Jokseenkin harvinainen ja yleisimmillään maamme järvialueen eteläosissa. Lajia tavataan lumpeita ja ulpukkaa kasvavilla lammilla ja järvillä. Rauhoitettu.



Pikkulampikorento

Myrtrollslända, *Leucorrhinia dubia*
Hyvin yleinen laji, joka muistuttaa paljon isolampikorentoa, mutta on sitä pienempi. Tavataan koko maassa. Esiintyy erityisesti suoympäristöissä, suorantaisilla lammilla ja järvillä, mutta myös sora-kuopilla.



Täplälampikorento

Citronfläckad trollslända, *Leucorrhinia pectoralis*
Harvinainen laji, jonka tunnistaa takaruumiin yhdestä kirkkaammasta täplästä, joka tosin nuorilla yksilöillä ei juuri erotu muista täplistä. Tavataan vain Etelä-Suomessa ja erityisesti suojaissa lahdenpoukamissa, joissa on runsas vesikasvillisuus. Rauhoitettu.



Isolampikorento

Nordisk kärtrrollslända, *Leucorrhinia rubicunda*
Suuresti pikkulampikorentoa ulkonäöltään muistuttava laji, mutta sitä jonkun verran isompi. Takaruumiin täplät ovat isommat kuin pikkulampikorennolla. Yleinen koko maassa ja esiintyy erilaisissa pienvesissä sekä järvissä. Aloittaa lentonsa toukokuun lopussa ja on yksi kesän ensimmäisistä lajeista.



Metsätalous ja sudenkorennot

Vaikka sudenkorennot eivät lukeudu varsinaiseen metsälajistoomme, voidaan metsätalouden toimintaratkaisuihin vaikuttaa merkittävästi useiden sudenkorentolajien menestymismahdollisuuksiin. Metsälaissa mainituilla erityisen tärkeillä elinympäristöillä on keskeinen rooli purojen varsilla, lammissa ja vähäpuustoisilla soilla esiintyvien sudenkorentojen elinympäristöjen säilyttämisessä. Pienvedet lähiympäristöineen ja vähäpuustoiset suot ovat lukumäärältään yleisimpiä metsiimme sijoittuvia arvokohteita, joita metsienkäsittelyssä on systemaattisesti otettu huomioon 1990-luvulta lähtien. Metsätalouden vesiensuojelutoimilla on selkeitä välillisiä vaikutuksia osaltaan myös jokien, järvien ja merenlahtien sudenkorentojen esiintymiseen.

Sudenkorentojen toukkia



KIRJALLISUUTTA

Uusi kotimainen kirja:

Karjalainen, S. 2002. Suomen sudenkorennot. Tammi, Helsinki. 222 s.

Vanhat kotimaiset kirjat:

Valle, K.J. 1922. Suomen sudenkorennoiset. Otavan hyönteiskirjasia 2. Otava, Helsinki. 83 s.

Valle, K.J. 1952. Sudenkorennot, Odonata. Suomen eläimet - Animalia Fennica 7. 159 s.

Euroopan lajistoa esitteleviä kirjoja:

Askew, R.R. 1988 (2. painos 2004). The Dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester. 291 s.

Brooks, S. (toim.). 1997. Field Guide to the Dragonflies and Damselflies of Great Britain and Ireland. British Wildlife Publishing, Hampshire. 160 s.

Nielsen, O.F. 1998. De danske guldsmede. Apollo Books, Stensrup. 279 s.

Sahlén, G. 1996. Sveriges Trollsländor. Fältbiologerna, Stockholm. 162 s.

Sandhall, Å. 1987 (2. painos 2000). Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm. 251 s.

Perusteos sudenkorentojen käyttäytymisestä ja ekologiasta:

Corbet, P.S. 1999. Dragonflies: Behaviour and Ecology of Odonata. Harley books, Colchester. 829 s.

Määrittyskaava (myös toukista):

Norling, U & Sahlén, G. 1997. Odonata, Dragonflies and Damselflies. Teoksessa: Nilsson, A. N. (toim.): Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook. Apollo Books, Stensrup. Volume 2: 13-66.

INTERNET

www.korento.net